



Nombre

Fecha

Unidad/Centro

Nº Historia

ESTADÍOS DE ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP)

Población diana: Población general. Se trata de una escala **heteroadministrada** que valora y clasifica el estadio de las úlceras por presión. A mayor estadio, mayor gravedad de la úlcera por presión.

Estadio	SIGNOS CLÍNICOS
I	<ul style="list-style-type: none">▪ Alteración observable en la piel íntegra, relacionada con la presión, que se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece al presionar; en pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o morados.▪ En comparación con un área (adyacente u opuesta) del cuerpo no sometida a presión, puede incluir cambios en uno o más de los siguientes aspectos:<ul style="list-style-type: none">- Temperatura de la piel (caliente o fría)- Consistencia del tejido (edema, induración)- y/o sensaciones (dolor, escozor)
II	<ul style="list-style-type: none">▪ Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas.▪ Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial.
III	<ul style="list-style-type: none">▪ Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero no por la fascia subyacente.
IV	<ul style="list-style-type: none">▪ Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.).▪ En este estadio como en el III, pueden presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos.

Referencias bibliográficas

- Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP). Clasificación-Estadiaje de las Úlceras por Presión. Logroño. 2003