



Nombre

Fecha

Unidad/Centro

Nº Historia

ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERECTIL

Población diana: Población varón general. Se trata de un cuestionario **autoadministrado**, que consta de 5 ítems con 5 opciones de respuesta cada una.

Instrucciones:

Por favor, marque con una X la respuesta que mejor describa su situación durante los últimos 6 meses. Es preciso hacer dos aclaraciones:

* El acto sexual se define como la penetración de la pareja.

* La estimulación sexual incluye situaciones como juegos amorosos con una pareja o mirar fotos eróticas, etc.

¿Cómo clasificaría su confianza para conseguir y mantener una erección?

	Muy baja
	Baja
	Moderada
	Alta
	Muy alta

Quando tuvo erecciones con la estimulación sexual, ¿Con qué frecuencia sus erecciones fueron suficientemente rígidas para la penetración?

	Nunca / Casi nunca
	Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
	A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
	La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
	Casi siempre / Siempre

Durante el acto sexual, ¿Con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección después de haber penetrado a su pareja?

	Nunca / Casi nunca
	Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
	A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
	La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
	Casi siempre / Siempre

Durante el acto sexual, ¿Qué grado de dificultad tuvo para mantener la erección hasta el final del acto sexual?

	Extremadamente difícil
	Muy difícil
	Difícil
	Ligeramente difícil
	No difícil

Quando intentó el acto sexual, ¿Con qué frecuencia fue satisfactorio para usted?

	Nunca / Casi nunca
	Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
	A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
	La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
	Casi siempre / Siempre

ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERECTIL

Instrucciones para el profesional:

Población diana: Población varón general. Se trata de un cuestionario **autoadministrado**, que consta de 5 ítems con 5 opciones de respuesta cada una. El rango de puntuación oscila entre 5 y 25 puntos, considerando el punto de corte óptimo en 21. La Disfunción eréctil se puede clasificar en cinco categorías: Severa (puntuación 5-7), Moderada (8-11), De media a moderada (12-16), Media (17-21), y No sufre disfunción eréctil (22-25).

¿Cómo clasificaría su confianza para conseguir y mantener una erección?

1	Muy baja
2	Baja
3	Moderada
4	Alta
5	Muy alta

Quando tuvo erecciones con la estimulación sexual, ¿Con qué frecuencia sus erecciones fueron suficientemente rígidas para la penetración?

1	Nunca / Casi nunca
2	Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
3	A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
4	La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
5	Casi siempre / Siempre

Durante el acto sexual, ¿Con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección después de haber penetrado a su pareja?

1	Nunca / Casi nunca
2	Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
3	A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
4	La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
5	Casi siempre / Siempre

Durante el acto sexual, ¿Qué grado de dificultad tuvo para mantener la erección hasta el final del acto sexual?

1	Extremadamente difícil
2	Muy difícil
3	Difícil
4	Ligeramente difícil
5	No difícil

Quando intentó el acto sexual, ¿Con qué frecuencia fue satisfactorio para usted?

1	Nunca / Casi nunca
2	Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
3	A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
4	La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
5	Casi siempre / Siempre

Referencias bibliográficas

- Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM. Development and evaluation of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Imp Res 1999; 11(6): 319-326.
- Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J and Mishra A. The International Index of Erectile Function (IIEF): a multidimensional scale for assesment of erectile dysfunction. Urology 1997; 49: 822-830.
- Pendiente de validación clinimétrica en el contexto español.